

『がん治療医が本当に知りたかった  
緩和ケアのレシピ』  
正誤表

『がん治療医が本当に知りたかった緩和ケアのレシピ』（2020年9月10日 第1版第1刷～2022年4月20日 第3刷）におきまして誤りがございました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2023年3月1日 メジカルビュー社編集部)

	誤	正
P47 3行目	注射薬（持続皮下注）で開始する場合 の処方例（4.8mg/日）	注射薬（持続皮下注）で開始する場合 の処方例（0.48mg/日）

『がん治療医が本当に知りたかった緩和ケアのレシピ』  
正誤表

『がん治療医が本当に知りたかった緩和ケアのレシピ』（2020年9月10日 第1版第1刷）におきまして誤りがございました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2021年1月21日 メジカルビュー社編集部)

	誤	正
p29 アセトアミノフ ェンの使い方	最大投与量は400mg/日（乳幼児および小児は10～15mg/kg/回を4～6時間間隔。60mg/kg/日を限度とする）。	最大投与量は4,000mg/日（乳幼児および小児は10～15mg/kg/回を4～6時間間隔。60mg/kg/日を限度とする）。
p132 「図1 腸腰筋」図 内	腸腰筋	腸骨筋
p.319 皮下注射 フェンタニル注	10mL (0.2mg)	10mL (0.5mg)