

『患者に合わせた処方意図がわかる！ 同効薬・類似薬のトリセツ』正誤表

『患者に合わせた処方意図がわかる！ 同効薬・類似薬のトリセツ』第1版第1刷（2023年3月30日）～第1版第3刷（2024年6月30日）に誤りがありました。
ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。（2025年2月25日メジカルビュー社編集部）



ページ	該当箇所	誤	正
p.44	Question	フロセミド(ループ利尿薬)とトリクロルメチアジド(サイアザイド系利尿薬)を使用している2人の患者は、いずれもカルシウム(Ca)拮抗薬と利尿薬が併用されています。2人の背景にはどのような違いがあるのでしょうか？	サイアザイド系利尿薬（ヒドロクロロチアジド・トリクロルメチアジド），ループ利尿薬（フロセミド）を使用している2人の患者に，カルシウム（Ca）拮抗薬が併用されています。背景はどのように異なるのでしょうか？ （Questionの文章を訂正）
p.44	処方箋（Case2）	トリクロルメチアジド（フルイトラン®）錠4mg 1回1錠	トリクロルメチアジド（フルイトラン®）錠2mg 1回2錠

『患者に合わせた処方意図がわかる！ 同効薬・類似薬のトリセツ』正誤表

『患者に合わせた処方意図がわかる！ 同効薬・類似薬のトリセツ』第1版第1刷（2023年3月30日）に誤りがありました。

ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

（2023年5月19日メジカルビュー社編集部）

ページ	該当箇所	誤	正
p.48	処方箋（変更前・変更後）	フェブキシスタット（フェブリク®）錠	フェブキシスタット（フェブリク®）錠 20mg
p.105	表1中 代表的な商品名 （リナグリプチンの欄）	トラディアンス®配合錠 BP（エンパグリフロジン 25 mg）	トラディアンス® 配合錠 BP（エンパグリフロジン 25 mg/ リナグリ プチン5mg ）
p.160	図1b気管支喘息	軌 道過敏性亢進	気 道過敏性亢進
p.203	図1タイトル	トラマドール塩酸塩 ・活性代謝物M1の作用	トラマドール ・活性代謝物M1の作用
p.217	本文上から6行目	一方、粘液 修復 薬の…	一方、粘液 潤滑 薬の…
p.218	本文下から2行目	ムコダイン® 錠	ムコダイン®
p.231	処方箋（Case1・Case2）	ボノプラザン（タケキャブ®）錠 20 m G レバミピド（ムコスタ®）錠 100 m G	ボノプラザン（タケキャブ®）錠 20 m g レバミピド（ムコスタ®）錠 100 m g
p.331	本文下から2行目	…症の違いから、 レストレックス 症候群…	…症の違いから、 レストレスレッグス 症候群…
p.335	図1内の見出し	速放製剤・徐放製剤（ロピニ カ ール;定常状態での内服時） 貼付製剤（ロチゴ ジ ン貼付時）	速放製剤・徐放製剤（ロピニ ロ ール;定常状態での内服時） 貼付製剤（ロチゴ チ ン貼付時）
p.341	Answer	・スマトリプタンは血管収縮作用があり、脳血管障害や心疾患のある患者には禁忌です。 ・ スマトリプタンはラスミジタンよりも安価であるため ，心血管疾患およびコントロール不良の高血圧を合併する片頭痛患者への使用が推奨されます。	・スマトリプタンは ラスミジタンよりも安価ですが ，血管収縮作用があり，脳血管障害や心疾患のある患者には禁忌です。 ・ ラスミジタンはスマトリプタンよりも血管への影響が少なく ，心血管疾患およびコントロール不良の高血圧を合併する片頭痛患者への使用が推奨されます。
p.349	本文上から4行目	…断薬はタムスロシン、シ ド ロシン、…	…断薬はタムスロシン、シ ロド シン、…
p.383	図2	 文献4) より引用	 「精製ヒアルロン酸Na点眼」と 「ジクアホソル Na点眼」を 入れ替え（□） 文献4) より引用

『患者に合わせた処方意図がわかる！ 同効薬・類似薬のトリセツ』正誤表

『患者に合わせた処方意図がわかる！ 同効薬・類似薬のトリセツ』（2023年3月30日 第1版第1刷）に誤りがありました。
ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2023年4月4日メジカルビュー社編集部)

ページ	該当箇所	誤	正
p.vi	高血圧治療薬①のタイトル	エナブラ ソ ルとテルミサルタン…	エナブラ リ ルとテルミサルタン…
p.vi	利尿薬②の頁数	8	48
p.x	抗菌薬③の頁数	83	283
p.4	表1タイトル	エナブラリルと バル サルタンの比較	エナブラリルと テル ミサルタンの比較
p.11	表1タイトル	ロサルタンと テル ミサルタンの比較	ロサルタンと バル サルタンの比較
p.196	図1 エスフルルピプロフェン・ハッカ油内の見出し	2規格（サイズ）	1規格（サイズ）
p.198	文献	3) 大正製薬、帝人ファーマ：ロコアテープを適正にご使用いただくために（2019年4月改訂） https://medical.taisho.co.jp/di/infoproper/infoproper_loqoa.pdf （2023年2月20日閲覧） 4) 久光製薬：光接触皮膚炎発現後の注意-光接触皮膚炎を悪化させないために-（2022年7月改版） https://www.hisamitsu.co.jp/medical/data/hisamitsu-anzentokusyuu.pdf （2023年2月20日閲覧）	3) 久光製薬：光接触皮膚炎発現後の注意-光接触皮膚炎を悪化させないために-（2022年7月改版） https://www.hisamitsu.co.jp/medical/data/hisamitsu-anzentokusyuu.pdf （2023年2月20日閲覧） 4) 大正製薬、帝人ファーマ：ロコアテープを適正にご使用いただくために（2019年4月改訂） https://medical.taisho.co.jp/di/infoproper/infoproper_loqoa.pdf （2023年2月20日閲覧） 文献3) と4) を入れ替え
p.203	図1		
p.203,204	文献番号	2) 3) 4) 5) 6)	1) 2) 3) 4) 5) (元の文献1) 渡邊裕司：なぜ効く？どう違う？を理解し処方するための治療薬の臨床薬理データブック、日本医事新報社、2018. を削除)
p.208	表1一般名	トラマドール塩酸塩 オキシコドン塩酸塩水和物	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン ヒドロモルフォン塩酸塩
p.209	Case2 Rp.2	…1時間以上空けて内服 10日分	…1時間以上空けて内服 10回分
p.214	上から8行目	…使用することとなっている ¹⁾ 。…	…使用することとなっている ³⁾ 。…