

『コツさえわかればあなたも読める リハに役立つ脳画像』（2016年3月30日 第1版第1刷発行）に誤りがございました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2016年4月6日 メジカルビュー社 編集部)

訂正箇所	誤	正																																				
p4 コラム「予後予測のポイント」上から8行目	車椅子2人介助にとどまった4名は、	車椅子2人介助にとどまった 5 名は、																																				
p14 本文上から6行目	T2 スター強調画像 (T2*WI), CT では	T2 スター強調画像 (T2*WI) が CT では																																				
p15 図2 タイトル	T2*WI による微小脳出血の検出	T2*WI																																				
p15 図2 図説明	両側のレンズ核に微小脳出血を示す低信号域 (→) が見られる。	両側のレンズ核に 鉄の沈着 を示す低信号域 (→) が見られる。 微小出血は、p.163 図4のT2*強調画像の低信号域を参照。																																				
p22 図2 「③側脳室前角・後角のレベル」矢印の指し位置																																						
p36 図2 ・「舌状回」を右端へ移動 ・「頭頂後頭溝」の指し線の追加																																						
p121 図3②図説明	小脳失調や半側空間無視など視床障害による 症状出	小脳失調や半側空間無視など視床障害による 症状出現																																				
p123 図2, p127 図1, p129 図2, p130 図4	MRI T1 強調画像	MRI FLAIR 画像																																				
p147 図3 上段右, 下段左の表 「左レンズ核」の症状	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部位</th> <th>状態</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①正中線</td> <td>5mm未満の偏倚</td> <td>明確な示唆なし</td> </tr> <tr> <td>②左内包後脚</td> <td>血腫</td> <td>右片麻痺(中等度), 感覚障害</td> </tr> <tr> <td>③左レンズ核</td> <td>血腫</td> <td>明確な示唆なし</td> </tr> <tr> <td>④左島の皮質下</td> <td>血腫</td> <td>伝導失語, 記憶障害, pusher現象</td> </tr> <tr> <td>⑤左前頭葉白質</td> <td>浮腫</td> <td>注意障害(一過性)</td> </tr> </tbody> </table>	部位	状態	症状	①正中線	5mm未満の偏倚	明確な示唆なし	②左内包後脚	血腫	右片麻痺(中等度), 感覚障害	③左レンズ核	血腫	明確な示唆なし	④左島の皮質下	血腫	伝導失語, 記憶障害, pusher現象	⑤左前頭葉白質	浮腫	注意障害(一過性)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部位</th> <th>状態</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①正中線</td> <td>5mm未満の偏倚</td> <td>明確な示唆なし</td> </tr> <tr> <td>②左内包後脚</td> <td>血腫</td> <td>右片麻痺(中等度), 感覚障害</td> </tr> <tr> <td>③左レンズ核</td> <td>血腫</td> <td>明確な示唆なし</td> </tr> <tr> <td>④左島の皮質下</td> <td>血腫</td> <td>伝導失語, 記憶障害, pusher現象</td> </tr> <tr> <td>⑤左前頭葉白質</td> <td>浮腫</td> <td>注意障害(一過性)</td> </tr> </tbody> </table> <p>筋緊張制御, 学習, 意思決定の障害</p>	部位	状態	症状	①正中線	5mm未満の偏倚	明確な示唆なし	②左内包後脚	血腫	右片麻痺(中等度), 感覚障害	③左レンズ核	血腫	明確な示唆なし	④左島の皮質下	血腫	伝導失語, 記憶障害, pusher現象	⑤左前頭葉白質	浮腫	注意障害(一過性)
部位	状態	症状																																				
①正中線	5mm未満の偏倚	明確な示唆なし																																				
②左内包後脚	血腫	右片麻痺(中等度), 感覚障害																																				
③左レンズ核	血腫	明確な示唆なし																																				
④左島の皮質下	血腫	伝導失語, 記憶障害, pusher現象																																				
⑤左前頭葉白質	浮腫	注意障害(一過性)																																				
部位	状態	症状																																				
①正中線	5mm未満の偏倚	明確な示唆なし																																				
②左内包後脚	血腫	右片麻痺(中等度), 感覚障害																																				
③左レンズ核	血腫	明確な示唆なし																																				
④左島の皮質下	血腫	伝導失語, 記憶障害, pusher現象																																				
⑤左前頭葉白質	浮腫	注意障害(一過性)																																				