

『意外と知らない!? くすりのTips』

『意外と知らない!? くすりのTips』(2015年3月10日第1版第1刷発行) に誤りがありました。ここに深くお詫びいたし、訂正申し上げます。

(2015年9月4日 メジカルビュー社 編集部)

頁	該当箇所	誤	正
p.17	Advice, 2行目	基本的には抗アルドステロン系利尿薬とカリウム製剤の併用は禁忌と なって～	基本的にはエプレレノンとカリウム製剤の併用は禁忌となって～
p.90	解説③	2013年9月のFDAの薬品安全情報によれば、ともにCYP3A4により代謝されることからロスバスタチン、シンバスタチン内服時にクラリスロマイシンを併用すると、横紋筋融解症の発症リスクが上がることが指摘されています。クラリスロマイシン投与の有益性が上回り、投与せざるをえないときにはロスバスタチン、シンバスタチンは休薬が推奨されています。	2013年9月のFDAの薬品安全情報によれば、ともにCYP3A4により代謝されることからロスバスタチン(本邦未発売)、シンバスタチン内服時にクラリスロマイシンを併用すると、横紋筋融解症の発症リスクが上がることが指摘されています。クラリスロマイシン投与の有益性が上回り、投与せざるをえないときにはロスバスタチン、シンバスタチンは休薬が推奨されています。
p.106	症例, 2行目	サンゼルス分類 grade Dの逆流性食道炎を認めた。タケプロン®20mg～	サンゼルス分類 grade Dの逆流性食道炎を認めた。タケプロン®15mg～
p.130	解説①, 3行目	しますが, 1割以上が急性肝不全(および～	しますが, 1%以上が急性肝不全(および～
p.229	DRUG LIST, 2行目	アモキシシリン: クラバモックス®	アモキシシリン: サワシリン®